

Lanzogast

Spansule Capsules

RP
Reva Pharma

Each capsule contains: 15mg or 30mg of Lansoprazole as enteric-coated pellets. This is a preparation of Lansoprazole, a proton pump inhibitor. It is an irreversible inhibitor of the parietal cell H⁺-K⁺ ATPase, which leads to profound inhibition of gastric acid secretion.

Indications: Duodenal ulcer, Gastric ulcer, Esophagitis/Ulceration, Zollinger-Ellison Syndrome, resistant ulcers and esophagitis and eradication of H. pylori in the treatment of peptic ulcer (in combination with antibiotics).

Dosage and Administration:

- Benign gastric ulcer: 30 mg daily in the morning for 8 weeks.
- Duodenal ulcer: 30 mg daily in the morning for 4 weeks; maintenance 15mg daily.
- NSAIDs-associated duodenal or gastric ulcer: 15-30 mg daily for 4 weeks, followed by a further 4 weeks if not fully healed.
- Zollinger-Ellison Syndrome (and other hyper secretory conditions): Initially 60 mg once daily adjusted according to response; daily doses of 120 mg or more is given in two divided doses.
- Gastro-esophageal reflux disease : 30 mg daily in the morning for 4 weeks, followed by a further 4 weeks if not fully healed; maintenance 15-30 mg daily.
- Acid-related dyspepsia: 15-30 mg daily in the morning for 2-4 weeks.

Side Effects:

Long-term treatment with a proton pump inhibitor in patients with H. pylori infection may accelerate the development of atrophic gastritis. Dose dependent diarrhea or headache may occur.

Drug Interactions:

Lansoprazole appears to be a selective inhibitor of the cytochrome P450 monooxygenase system; there may be an effect on hepatic clearance, but there have been no reports to date of clinically relevant interactions. There is some uncertainty over the effect of Lansoprazole on the combined oral contraceptive pill.

Warning & Precautions:

The drug is not recommended for use with neonates. The youngest person to have received Lansoprazole in clinical trials was 13 years old. No problems have been encountered in clinical use and there has been no increase in adverse drug reaction in the elderly.

Use in Pregnancy & Lactation: There is no relevant human data in pregnancy. Use is not recommended without physician's council.

Contraindications: The use of this drug is contraindicated in patients with a history of hypersensitivity to any of its ingredients.

Storage

Store in a dry place at a temperature not exceeding 25° C and protect from light.

Packaging:

Lanzogast 20 Capsule: Box containing 20 capsules in 2 x 10's blister strips. Each capsule contains Lansoprazole 15 mg or Lansoprazole 30 mg as enteric-coated pellets.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria

RP
ريفا فارما

سبانسول كبسول

لانزوجاست

تحتوي كل كبسولة على ١٥ مغ أو ٣٠ مغ لانسوبرازول على شكل حبيبات ملبسة معوياً. هذا الدواء مستحضر لانسوبرازول الذي يعمل كمثبط لمضخة البروتون، عن طريق تثبيط اللاعكوس لأنزيم الأتاباز في خلايا بارييت (مضخة شاردة الهدروجين - شاردة البوتاسيوم)، الذي يؤدي لكبح قوي لإفراز الحمض المعدي.

الاستطبابات

القرحة العفجية، القرحة المعدية، تقرح المريء، متلازمة زولينجر- إيلسون، القرحات المععدة، بالإضافة للقضاء على جرثومة هيليكوباكتر بيلوري في القرحة الهضمية (بالمشاركة مع المضادات الحيوية).

الجرعة والاستخدام

- قرحة المعدة الحميدة: ٣٠ مغ يومياً صباحاً لمدة ثمانية أسابيع.
- القرحة العفجية: ٣٠ مغ يومياً صباحاً لمدة أربعة أسابيع، الجرعة الداعمة: ١٥ مغ يومياً.
- القرحة المعدية أو العفجية المسببة باستخدام مضادات الالتهاب اللاستيرويدية: ١٥ إلى ٣٠ مغ يومياً لمدة أربعة أسابيع يمكن المتابعة بعدها لأربعة أسابيع أخرى إذا لم يتحقق الشفاء الكامل.
- متلازمة زولينجر- إيلسون (وحالات فرض الإفراز الأخرى): جرعة هجومية ٦٠ مغ مرة واحدة يومياً ثم يمكن رفع الجرعة حتى ١٢٠ مغ أو أكثر على مرتين يومياً حسب الاستجابة.
- القلنس المريئي المعدي: ٣٠ مغ مرة واحدة يومياً صباحاً لمدة أربعة أسابيع، يمكن المتابعة بعدها لأربعة أسابيع أخرى إذا لم يتحقق الشفاء الكامل، الجرعة الداعمة: ١٥ إلى ٣٠ مغ يومياً.
- عسر الهضم المرتبط بفرط الحموضة: ١٥ إلى ٣٠ مغ مرة واحدة يومياً صباحاً لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

التأثيرات الجانبية

الاستخدام المديد لمثبطات البروتون عند مرضى جرثومة هيليكوباكتر بيلوري قد يسرع الإصابة بالتهاب المعدي التنكسي.

كما يمكن حدوث إسهال أو صداع بشكل مرتبط بالجرعة.

التداخلات الدوائية

إن لانسوبرازول مثبط إنتقائي لجملة السيوكروم مونوأوكسيجيناز P450، لذلك قد يؤثر على التصفية الكبدية، لكن لالآن لا توجد تقارير سريرية عن عن مثل هذه التداخلات، كما لا توجد أدلة على تأثير لانسوبرازول على مضادات الحمل القوية متعددة الهورمون.

تحذيرات واحتياطات

لا يعطى هذا الدواء لحديثي الولادة، وأصغر الأشخاص الذين تم اختبار هذا الدواء عليهم سريرياً كانوا بعمر ١٣ سنة، لا توجد مشاكل سريرية ولا ارتفاع في التأثيرات الجانبية لدى استخدامه عند كبار السن.

الحمل والإرضاع

لا توجد معلومات حول استخدام هذا الدواء عند الحوامل، لكن يجب عدم إعطائه للحوامل بدون مشورة الطبيب.

مضادات الاستطباب

لا يستطاب هذا الدواء عند المرضى الذين لديهم حساسية لأي من مكوناته.

التخزين

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ م، بعيداً عن الضوء.

التعبئة

علبة تحتوي ٢٠ كبسولة سبانسولز في طرفين. تحتوي كل كبسولة على ١٥ مغ أو ٣٠ مغ لانسوبرازول على شكل حبيبات ملبسة معوياً.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله وفقاً للتعليمات بعرفتك للخطر
اتبع بدقة وصلة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك ، فالتبيب والصيدلي هما الذين يقران في الدواء وتلفعه وضرره.
تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
لا تترك الأدوية يتناول أيها الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب.

إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا