

Revacinolon

Suppositories



Composition and Drug Properties

Each suppository contains:

- Fluocinolone Acetonide 100 mcg.
- Lidocaine HCl 40 mg.
- Bismuth Subgallate 100 mg.
- Menthol 5 mg.

Fluocinolone Acetonide is an active topical corticosteroid with palliative anti-inflammatory effect.

Lidocaine Hydrochloride is a topically applied local anesthetic to the mucous membranes.

Bismuth Subgallate is an astringent and a protective agent. Menthol gives as cooling effect and also relieves pruritus.

Indications

- Hemorrhoids.
- Anal fissures.
- Anal itch and pruritus.

Contraindications and Precautions

This drug is contraindicated in the following cases:

- Present bacterial or fungal infection.
- Present Tubercular or Syphilis ulcers.
- Viral lesions.
- Pregnancy and lactation.

Duration of usage should not exceed 2-3 weeks.

Dosage & Application:

One suppository in the morning and one in the evening.

Storage: Keep in a dry place below 25° C.

Packaging : Box of 10 suppositories in two PVC/PE strips.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH of CHILDREN
Council of Arab Health Ministers- Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



تحاميل

ريفاسينولون

التركيب والخواص العلاجية

تحتوي كل تحميلة على:

- فلوسينولون أسيتونيد ١٠٠ مكغ.
- ليدوكائين هيدروكلوريد ٤٠ مغ.
- بيزموث ساب جالات ١٠٠ مغ.
- مينتول ٥ مغ.

الفلوسينولون أسيتونيد ستيروئيد قشري فعال يستعمل موضعياً كمكطف ومضاد للالتهاب.

الليدوكائين هيدروكلوريد يلعب دور مخدر موضعي للأغشية المخاطية.

تحت جالات البيزموث لها مفعول مقبض وواقى في نفس الوقت.

المينتول يعطي تأثيراً مبرداً ويخفف من التهيج.

الاستطابات

- البواسير.
- الشقوق الشرجية.
- الحكة والتهيج الشرجي.

مضادات الاستطباب والتحذيرات

لايستطاب استخدام هذا الدواء في الحالات التالية:

- وجود أخماج جرثومية أو فطرية.
- وجود تقرحات سلية أو زهرية (سيفيليس).
- وجود آفات فيروسية.
- الحمل والإرضاع.

وبجميع الأحوال يجب أن لاتستمر المعالجة بهذا الدواء أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

الجرعة والاستخدام : تحميلة واحدة صباحاً ومساءً.

التخزين : يحفظ هذا الدواء في مكان جاف بدرجة حرارة لاتتجاوز ٢٥ م°.

التعبئة : علبة تحتوي ١٠ تحاميل في شريطين.

الدواء مستحضر يوزن على صحتك واستعمله خلافاً للتعليمات يضر صحتك للخطر
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتصوص عليها وتعليمات الصيدلي
الذي صرفها لك ، فالطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء ونفعه وضرره.
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
لا تترك الأدوية يستعمل ايدي الأطفال .
مجلس وزراء الصحة العربي واتحاد الصيدلة العرب.

إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا